

## CUM TE POȚI PROTEJA?

- evită contactele sexuale cu persoane necunoscute.
- evită folosirea în comun a acelor, seringilor întrebuințate în consumul de droguri.
- păstrați o igienă zilnică a organelor sexuale.
- gândește-te bine înainte de a avea un contact sexual și discută cu partenerul toate aspectele legate de trecutul vostru sexual.
- nu uita că nici un prezervativ nu îți oferă protecție maximă împotriva B.T.S.
- decide să ai o relație sexuală stabilă și bazată pe FIDELITATE.
- doar ABSTINENȚA îți asigură o protecție maximă.



## AI CONTRACTAT DEJA O B.T.S.?

1. Nu neglija problema, boala nu se vindecă singură!
2. Consultă medicul!
3. Urmează tratamentul necesar!
4. Adoptă o conduită responsabilă și nu neglija riscul de a infecta pe alții!
5. Corectează-ți comportamentul sexual!

**NU AMÂNA,  
REZOLVĂ PROBLEMA  
CÂT MAI REPEDE!**


## GÂNDEȘTE-TE!

O boală mortală poate fi transmisă doar printr-un singur contact sexual!

Relația intimă poate dura doar câteva minute, boala contractată poate fi pentru toată viața!

Prezervativul nu oferă protecție 100% împotriva virusului H.I.V. și altor B.T.S.

Multe boli cu transmitere sexuală sunt localizate și în afara zonelor acoperite de prezervativ



## CHIAR DACĂ FOLOSEȘTI

## PREZERVATIVUL

## AR PUTEA FI FATAL PENTRU TINE!

Fundația Solidaritate și Speranță

Centrul InfoAdolescent

Iași, Str. C. Negri nr. 48

Tel: 0232 220548, 0332 805750

[www.infoadolescent.ro](http://www.infoadolescent.ro)

## BOLI CU TRANSMITERE SEXUALĂ



Design: Cornelia Guțu

...ȘI O SECUNDĂ

TE POATE COSTA VIAȚA!




Centrul INFOADOLESCENT

Programul Dragoste și responsabilitate

**Bolile cu transmitere sexuală sau bolile venerice sunt boli care se transmit de la o persoană la alta prin contact sexual.**

**DECI, CINE ARE GRIJA DE SINE  
NU SE ÎMBOLNĂVEȘTE!**



#### **CHLAMYDIA**

- este una dintre cele mai rapide boli în ceea ce privește evoluția, simptomele apar la 7-12 zile de la contactul sexual  
**bărbați:** inflamarea uretrei, dureri la urinat, secreție peniană (albicioasă sau galbenă)  
**femei:** creșterea secrețiilor vaginale, dureri abdominale, dureri la urinat  
Netratată provoacă infecții foarte grave la femei, și duce la sterilitate, atât în cazul femeilor cât și a bărbaților.

#### **HERPESUL GENITAL**

- este incurabil, se transmite și prin contact piele cu piele în zona organelor genitale, se manifestă prin apariția de mici vezicule pe organele genitale, care se transformă rapid în răni dureroase.  
**La bărbați** aceste răni sunt vizibile.  
**La femei**, rănilor sunt localizate adânc în vagin sau la nivelul colului uterin.  
*- determină apariția cancerului de col uterin și poate trece de la mamă la făt provocând orbire, surditate, retardare mentală sau chiar moartea.*

#### **SIFILISUL**

- este singura B.T.S. care se transmite foarte ușor prin sărut  
- evoluează în trei faze:  
**sifilisul primar** - debut la 3 săptămâni de la infectare; apare o ulceră lucioasă, dură la palpare, nedureroasă, rotundă sau ovală.  
**sifilisul secundar** - debut la 2-3 luni de la infectare; apar erupții pe piele, în gură sau pe organele genitale.  
ACESTE DOUĂ FAZE SUNT VINDECABILE

**sifilisul terțiar** - debutează după doi sau mai mulți ani de la infectare și produce leziuni distructive la nivelul pielii, oaselor, inimii, vaselor sanguine, creierului, măduvei spinării, organelor interne. Duce la orbire, paralizie, demență, moarte. Se transmite la făt.

#### **Prezervativul**

**NU îți oferă protecție**

#### **HEPATITA B ȘI C**

Se transmite prin sânge infectat și prin contact sexual neprotejat. Cel mai adesea nu apar simptome. Uneori pot apărea stări de oboseală, pierderea poftei de mâncare, icter, urină de culoare închisă, scaun deschis la culoare.  
În unele cazuri boala avansează spre hepatită cronică și chiar ciroză. Se transmite de la mamă la făt

#### **H.I.V. / SIDA**

Distruge sistemul imunitar al organismului care devine incapabil să se apere în lupta cu infecțiile. Simptomele apar după mai mulți ani de la infectare, timp în care persoana infectată arată perfect sănătoasă dar poate transmite altora virusul HIV.

#### **NEGII GENITALI (CONDILOAME)**

- proeminențe dureroase de culoarea pielii, care apar în jurul organelor genitale și a anusului.  
- apar la 2-6 luni de la contactul sexual.  
- sunt incurabili.  
- femeile care au contractat virusul prezintă un risc foarte mare pentru cancerul de col uterin.

#### **GONOREEA**

- mai este denumită și sculament sau blenoragie.  
**Simptome:**  
**La bărbați:** usturimi foarte mari la urinat, scurgere albă sau galben verzui din penis, mâncărime sau scurgeri din anus, răni în gât (dacă a fost transmis prin contact sexual oral)  
**La femei:** secreții vaginale apoase sau galben-verzui, dureri abdominale, dureri la urinat, iritații ale gâtului; simptomele apar doar la 20% din cazuri.  
**Complicații:** netratată, infecția poate provoca sterilitate, atât în cazul bărbaților cât și al femeilor. Poate fi transmisă copilului în timpul nașterii provocând infecții la ochi. La bărbați pot apărea cicatrici pe penis care îngreunează urinarea.

#### **CANDIDOZA**

- nu se transmite neapărat prin contact sexual ci se poate declanșa când se iau anumite antibiotice.  
**Simptome:**  
**La femei:** iritație în zona genitală, secreție albă, vâscoasă cu miros neplăcut, dureri la urinat.  
**La bărbați:** iritație și mâncărime în zona genitală, scurgeri din uretră, dureri la urinat.



#### **TRICHOMONIAZA**

Este cauzată de un parazit ce se găsește în vagin și în uretră. La 3-4 săptămâni de la contactul sexual apar următoarele simptome:  
- scurgeri verzui-gălbui cu miros neplăcut, din vagin sau din penis.  
- iritație și mâncărime în zona vaginală sau peniană